


سؤالات آزمون نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد صفحه: ۳	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۹ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۱	واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ نامه بنویسید. الف) تندی متوسط، کمیتی (نرده ای - برداری) است. ب) مساحت سطح بین نمودار $a-t$ و محور t در هر بازه زمانی، برابر اندازه تغییر (مکان - سرعت) در آن بازه است. پ) بزرگی نیروی گرانشی که دو جسم به یکدیگر وارد می کنند با (مربع - جذر) فاصله آن ها نسبت وارون دارد. ت) وقتی چشمه صوت به ناظر ساکن نزدیک می شود، بسامدی که ناظر دریافت می کند (کاهش - افزایش) می یابد. ث) صوت یک موج (عرضی - طولی) است. ج) اثر فوتوالکتریک با استفاده از نظریه فیزیک (کلاسیک - جدید) قابل توجیه است. چ) در پرتوزایی طبیعی، پرتو (گاما - آلفا) بیشترین نفوذ را در ورقه سربی دارد.	۱/۷۵
۲	شکل روبه رو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می دهد که در راستای محور x با شتاب ثابت حرکت می کند.  الف) سرعت اولیه متحرک در جهت محور x است یا خلاف جهت محور x؟ ب) در کدام بازه زمانی متحرک در حال دور شدن از مبدأ است؟ پ) در چه لحظه ای جهت بردار مکان عوض شده است؟ ت) در کدام بازه زمانی حرکت متحرک تند شونده است؟ ث) علامت بردار شتاب متحرک مثبت است یا منفی؟	۱/۲۵
۳	متحرکی با سرعت ثابت بر روی محور x حرکت می کند و در لحظه $t_1 = 2s$ در مکان $x_1 = 3m$ و در لحظه $t_2 = 5s$ در مکان $x_2 = -6m$ قرار دارد. مکان اولیه و معادله مکان - زمان متحرک را به دست آورید.	۱/۲۵
۴	متحرکی با شتاب ثابت $2 \frac{m}{s^2}$ و تندی $10 \frac{m}{s}$ در خلاف جهت محور x شروع به حرکت می کند. الف) معادله سرعت - زمان متحرک را بنویسید. ب) نمودار سرعت - زمان متحرک را در $5s$ اول حرکت رسم کنید.	۰/۵ ۰/۵
۵	سیبی را در نظر بگیرید که به شاخه درختی آویزان است. نیروهای وارد بر سیب را رسم کنید و تعیین کنید واکنش هر یک از این نیروها به چه اجسامی وارد می شود؟	۱
۶	توپي به جرم 0.75 kg با سرعت ثابت $10 \frac{m}{s}$ به طور افقی حرکت می کند. الف) تکانه توپ را حساب کنید. ب) اگر تکانه توپ دو برابر شود، انرژی جنبشی آن چند برابر می شود؟ چرا؟	۰/۵ ۰/۵
	ادامه سؤالات در صفحه دوم	

سؤالات آزمون نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد صفحه: ۳	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۹ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۷	الف) دو عامل مؤثر بر اندازه نیروی مقاومت شاره را بنویسید. ب) در شکل روبه‌رو وقتی وزنه ۶۰ N را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر ۱۶ cm می‌شود و وقتی وزنه ۹۰ N را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر ۱۸ cm می‌شود. طول عادی فنر (بدون وزنه) چند سانتی‌متر است؟	۰/۵ ۰/۷۵
۸	در شکل روبه‌رو نیروی $F = ۵۰\text{ N}$ به جسمی به جرم ۱۰ kg وارد می‌شود. اگر جسم در آستانه حرکت قرار داشته باشد، ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح را محاسبه کنید. ($g = ۱۰\text{ N/kg}$)	۰/۷۵
۹	درستی یا نادرستی هر یک از گزاره‌های زیر را با واژه ((درست)) یا ((نادرست)) در پاسخ‌نامه مشخص کنید. الف) با افزایش جابه‌جایی از نقطه تعادل، انرژی جنبشی نوسانگر افزایش می‌یابد. ب) در امواج الکترومغناطیسی، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بر راستای انتشار موج عمودند. پ) در نوسان واداشته، یک نیروی خارجی به‌صورت دوره‌ای به نوسانگر وارد می‌شود. ت) دستگاه شنوایی انسان به بسامدهای متفاوت، حساسیت یکسان نشان می‌دهد. ث) وقتی نور به سطح صیقلی و هموار برخورد کند، بازتاب پخشنده رخ می‌دهد. ج) در پدیده شکست، همواره پرتوهای موج، عمود بر جبهه‌های موج هستند. چ) ضریب شکست شیشه برای طول‌موج‌های کوتاه‌تر، کمتر است.	۱/۷۵
۱۰	طنابی به جرم ۴ kg و طول ۴ m با نیروی ۱۰ N کشیده می‌شود. تندی انتشار موج عرضی در این طناب چقدر است؟	۰/۷۵
۱۱	با استفاده از یک آونگ ساده و زمان‌سنج، چگونه می‌توان شتاب گرانشی در مکانی خاص را اندازه گرفت؟	۱
۱۲	در یک سامانه جرم - فنر، فنر را به اندازه $۰/۱\text{ m}$ می‌کشیم و سپس رها می‌کنیم. اگر نوسانگر برای اولین بار در لحظه $t = ۰/۲۵\text{ s}$ از نقطه تعادل عبور کند، معادله حرکت آن را بنویسید.	۰/۷۵
۱۳	چشمه موجی با بسامد ۲۰ Hz در یک محیط که تندی انتشار موج در آن ۲۰۰ cm/s است، نوسان‌های عرضی ایجاد می‌کند. فاصله یک قله و یک دره متوالی چند سانتی‌متر است؟	۰/۷۵
۱۴	یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت صوت $\beta_1 = ۷۰\text{ dB}$ و دستگاه صوتی دیگر، صدایی با تراز شدت صوت $\beta_2 = ۱۰۰\text{ dB}$ ایجاد می‌کند. شدت صوت I_2 چند برابر شدت صوت I_1 است؟	۰/۷۵
	ادامه سؤالات در صفحه سوم	

سؤالات آزمون نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد صفحه: ۳	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۹ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد داخل و خارج کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۱۵	مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید. (الف) مکان یابی پژواکی (ب) نیمه عمر	۰/۵ ۰/۵
۱۶	توان باریکه نور خروجی یک لیزر $W/0.1$ است. اگر بسامد نور خروجی $Hz \times 10^{14} \times 5$ باشد، شمار فوتون هایی که در مدت $66s$ از این لیزر گسیل می شود، چقدر است؟ $(h = 6.6 \times 10^{-34} J.s)$	۱
۱۷	(الف) چرا هسته ها در واکنش های شیمیایی برانگیخته نمی شوند؟ (ب) دو مورد ناتوانی مدل اتم هسته ای رادرفورد را در تبیین پایداری اتم بنویسید. (پ) در یک هسته پرتوزا پس از هر واپاشی آلفا، عدد جرمی و عدد اتمی هسته دختر چه تغییری می کنند؟	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵
۱۸	الکترون اتم هیدروژن، گذاری همانند شکل روبه رو انجام می دهد. (الف) در این گذار فوتون جذب می شود یا گسیل؟ (ب) طول موج این فوتون در چه ناحیه ای از امواج الکترومغناطیسی قرار دارد؟ (پ) انرژی فوتون جذب یا گسیل شده، چند الکترون ولت است؟ ($E_R = 13/6 eV$)	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۱
	موفق باشید	

